

# Calendario de vacunación para niños y adolescentes recomendado para el estado de Nueva York

Una marca de verificación ✓ significa que esta es la mejor edad y la más temprana para vacunar a su hijo. Si su hijo no recibe la vacuna a la “mejor edad”, aun así debe vacunar lo más pronto posible. Consulte con su médico sobre poner al día las vacunas de su hijo.

Vacuna contra:	Nacimiento	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	15 meses	18-23 meses	4-6 años	11-12 años	16 años	
Hepatitis B	✓	✓ 1-2 meses		✓ 6-18 meses							
Rotavirus		✓	✓	✓ <sup>1</sup>							
Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP)		✓	✓	✓		✓ 15-18 meses		✓			
Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap) <sup>2</sup>									✓ <sup>2</sup>		
<i>Haemophilus influenzae</i> tipo b (Hib)		✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ 12-15 meses						
Enfermedad neumocócica (PCV) <sup>3</sup>		✓	✓	✓	✓ 12-15 meses		Consulte con su médico si su hijo de 2 años o más debe recibir la vacuna PPSV23. <sup>3</sup>				
Polio (IPV)		✓	✓	✓ 6-18 meses				✓			
Influenza				Se recomienda la vacuna anual para todos los niños de 6 meses de edad en adelante. Consulte con su médico si su hijo debe recibir una o dos dosis.							
Sarampión, paperas y rubeola (MMR) <sup>4</sup>				Ver nota a pie de página 4	✓ 12-15 meses			✓			
Varicela					✓ 12-15 meses			✓			
Hepatitis A					✓		✓				
Virus del papiloma humano (HPV) <sup>5</sup>									✓ <sup>5</sup>		
Enfermedad meningocócica <sup>6</sup>		Consulte con su médico si su hijo de 2 meses de edad o más debe recibir la vacuna contra la enfermedad meningocócica.							✓		✓

<sup>1</sup> Para la vacuna de algunos tipos de Hib y Rotavirus, no se necesita la dosis de los 6 meses.

<sup>2</sup> Tdap: Los niños de 7 a 10 años que no estén completamente vacunados contra la tos ferina deben recibir una dosis única de Tdap.

<sup>3</sup> PCV = vacuna conjugada contra el neumococo; PPSV23 = vacuna de polisacáridos contra el neumococo

<sup>4</sup> MMR: Los niños entre 6 a 11 meses de edad que van a viajar fuera de los EE. UU. deben recibir una dosis de MMR antes de viajar.

<sup>5</sup> La vacuna contra el HPV incluye dos dosis que se administran con 6 meses de diferencia. Se recomienda para niños y niñas. Es posible que los adolescentes que comienzan con las series luego de los 15 años de edad y algunos niños con afecciones médicas especiales necesiten tres dosis.

<sup>6</sup> Hay dos vacunas que protegen contra la enfermedad meningocócica. Es posible que algunos niños con afecciones médicas especiales necesiten la MCV4 y la MenB.